

Písmenná informácia pre používateľa

neo-angin® TVRDÉ PASTILKY ŠALVIA

dichlórbenzénmetanol, amylymetakrezol, levomentol

Pozorne si prečítajte celú písmennú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik.

- Túto písmennú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítili.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekára.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinkov, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písmennej informácii. Pozri časť 4.
- Ak sa do 3-4 dní nebudecie cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

V tejto písmennej informácii sa dozviete:

1. Čo je neo-angin® šalvia a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete neo-angin® šalviu
3. Ako užívať neo-angin® šalviu
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať neo-angin® šalviu
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. Čo je neo-angin® šalvia a na čo sa používa

neo-angin® šalvia je antiseptikum ústnej dutiny a hrldy. Používa sa na podpornú liečbu pri zápaloch sliznice dutiny ústnej v oblasti hltanu, ktoré sprevádzajú typické príznaky ako bolesť hrldy, sčervenanie alebo opuch.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete neo-angin® šalviu

Neužívanie neo-angin® šalviu

- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
- neo-angin® šalvia nie je vhodný pre deti mladšie ako 6 rokov.

Upozornenie a opatrenia

neo-angin® šalvia obsahuje 2,58 g sladidla izomaltu (náhrada cukru) v jednej pastilke, čo zodpovedá 6 kcal (26 kJ). Izomalt môže mať mierne laxativný účinok.

Iné lieky a neo-angin® šalvia

Ak teraz užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Vzájomné pôsobenia s inými liekmi nie sú známe.

neo-angin® šalvia a jedlo a nápoje

neo-angin® šalvia sa môže užívať kedykoľvek počas dňa nezávisle od jedla.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčite, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotniť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

Nie sú dostupné žiadne údaje o užívaní neo-angin® šalvie počas tehotenstva. Štúdie na zvieratách nepotvrdili priamy alebo nepriamý škodlivý účinkov na vývoj plodu, pôrod alebo vývoj dieťaťa.

Pre nedostatočok informácií nie je možné vylúčiť riziko pre plod a dojčenie dieťa, preto sa užívanie tohto lieku počas tehotenstva a dojčenia neodporúča.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Liek nemá vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

neo-angin® šalvia obsahuje izomalt a farbivo košenilovú červenú A

neo-angin® šalvia obsahuje sladidlo izomalt. Ak vám vás lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

neo-angin® šalvia obsahuje farbivo košenilovú červenú A, ktoré môže vyvoláť alergické reakcie.

3. Ako užívať neo-angin® šalviu

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto písmennej informácii alebo ako vám povedal váš lekár alebo lekárnik. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Ak vám lekár nedal iné odporúčanie, riadte sa týmito pokynmi: Dospelí a deti od 6 rokov nechajú pomaly rozprúsiť 1 pastilku v ústach každé 2 – 3 hodiny. Maximálna denná dávka je 6 pastilek. Ak sa do 3-4 dní nebudecie cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

4. Ak užijete viac neo-angin® šalvie, ako máte

Nebol hľásený nijaký prípad predávkovania.

5. Ako zabudnete užiť neo-angin® šalviu

Ak ste zabudli užiť neo-angin® šalviu, alebo ste užili menej pastilek ako ste mali, pokačujte užívaním nasledujúcou dávkou. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú pastilku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

6. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Po užíti neo-angin® šalvia sa pozorovali nasledujúce vedľajšie účinky:

Veľmi zriedkavé: - podráždenie ústnej a žalúdočnej sliznice

Neznáme: - alergické reakcie ako sú opuchy úst a jazyka.

Výskyt vedľajších účinkov sa hodnotí podľa nasledovných frekvencií:

Veľmi časté	môžu postihovať viac ako 1 z 10 osôb
Časté	môžu postihovať menej ako 1 z 10 osôb
Menej časté	môžu postihovať menej ako 1 zo 100 osôb
Zriedkavé	môžu postihovať menej ako 1 z 1 000 osôb
Veľmi zriedkavé	môžu postihovať menej ako 1 z 10 000 osôb
Neznáme:	častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov

Hľásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písmennej informácii. Vedľajšie účinky môžete hľať aj priamo prostredníctvom

Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv

Sekcia bezpečnosti liekov a klinického skúšania

Kvetná 11

825 08 Bratislava 26

Tel: + 421 2 507 01 206

Fax: + 421 2 507 01 237

internetová stránka: <http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov>

e-mail: neziaduce.ucincky@sukl.sk

Hľásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať neo-angin® šalviu

Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale.

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatuľke a blistri po skratke EXP.

Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo neo-angin® šalvia obsahuje

Liečivá sú: dichlórbenzénmetanol 1,20 mg, amylymetakrezol 0,60 mg, levomentol 5,90 mg v jednej pastilke.

Ďalšie zložky sú: silica máty piepornej, izomalt, kyselina vínna, šalviiová silica, košenilová červená (E 124), chinolinová zlt (E 104), patentná modrá (E 131).

Ako vyzerá neo-angin® šalvia a obsah balenia

neo-angin® šalvia sú okrúhle, medovo zafarbené, obojstranne vypuklé, čiastočne priehľadné, tvrdé pastilky.

Obsah balenia: 24 tvrdých pastilek v blistri.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

Divapharma GmbH

Motzener Strasse 41

D-12277 Berlin

Nemecko

Táto písmenná informácia bola naposledy aktualizovaná v 01/2016.